



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่



## อาการ

1.



ไข้สูงเฉียบพลัน  
เมื่ออาหาร หน้าแดง  
ปวดศีรษะ อารมณ์

2.



มีผื่น จุดสีแดง  
ขึ้นตามลำตัว แขน ขา  
หรือถ่ายอุจจาระดำ

## การรักษา



ให้ยาลดไข้ “พาราเซตามอล”  
ห้ามใช้แอสไพริน



พยายามดื่มน้ำมากๆ หรือ  
ดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



ถ้ามีอาการปวดท้อง ซึมลง  
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น  
ไข้ลด ให้รีบนำส่ง รพ. ทันที

3.



มีภาวะช็อกช่วงไข้ลด  
มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว

4.



ตับโต มีกกดเจ็บ  
บริเวณชายโครงขวา

## การป้องกัน

1. หากมีอาการ  
นำส่งสัควรรีบ  
พบแพทย์



2. ป้องกันยุงกัด

นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวด  
ในบ้าน และทายากันยุง



3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง  
ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ  
และปรับปรุงภูมิทัศน์  
รอบบ้านให้สะอาด





ป้องกันลูกน้อยจาก

# โรคไข้เลือดออก



โรคติดต่อเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่มี **ยุงลาย** เป็นพาหะ เมื่อคนถูกยุงกัดจะได้รับเชื้อไวรัสเด็งกี่อาจจะพบไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงหากไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที่ว่าจะนำไปสู่การเสียชีวิต

## อาการ



ไข้สูง ปวดตามตัว อ่อนแอ นอนหลับ ซึม



รับประทานอาหารไม่ได้  
อาเจียน ปวดท้อง




อาจมีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ




อาการหนักจน มีภาวะช็อก และเสียชีวิต


## การป้องกันโรคไข้เลือดออก



กำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย



นอนในมุ้ง ทายากันยุง



ควรไปพบแพทย์เมื่อป่วย เป็นไข้ ติดตามอาการ  
และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์



สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



Content : แพทย์หญิงประอร สุประสิทธิ์ ณ อยุธยา  
กุมารเวชศาสตร์ - โรคติดต่อ  
Design : ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
Credit Picture : www.freepik.com